

Ghid pentru spitale privind amplasarea dozatoarelor

Cum puteți optimiza amplasarea dozatoarelor pentru o igienă mai bună



Igiena adecvată a mâinilor este considerată cea mai importantă metodă de prevenire a contaminării și de reducere a infecțiilor intraspitalicești (HAI). Cercetările arată că dozatoarele pentru igiena mâinilor au un impact semnificativ asupra ratelor de conformitate¹, iar cheia succesului este asigurarea amplasării adecvate a acestora. În fapt, studiile arată că optimizarea amplasării dozatoarelor poate spori gradul de **utilizare a acestora cu mai mult de 50%**.²

Pentru a vă ajuta să sporiți respectarea standardelor privind igiena mâinilor în instituția dumneavoastră, am creat ghiduri pe bază de dovezi pentru amplasarea optimă a dozatoarelor. Vizualizările sugerează amplasarea dozatoarelor în zonele frecvent întâlnite în unitățile medicale care susțin conformitatea cu standardele importante ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 5 Momente pentru igiena mâinilor.

Informațiile din ghidul de amplasare se bazează atât pe cercetarea sponsorizată de Essity, cât și pe descoperirile independente din cadrul cercetărilor academice.

¹Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles, and Ed F Van Beeck. Evaluarea unei locații optime pentru dozatoarele de dezinfectant pe bază de alcool pentru mâini într-o cameră destinată pacienților din secția de Terapie Intensivă. BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510.

²Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent Dispensers on Alcohol-Based Hand Hygiene Product Usage in an Intensive Care Unit. J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263-267.




Think ahead.

Zone publice

Recomandări pentru spitale privind amplasarea dozatoarelor

În spațiile publice și în zonele destinate personalului, vizibilitatea dozatorului este foarte importantă pentru îmbunătățirea igienei. Mulți vizitatori nu își curăță mâinile la intrarea și la ieșirea din unitate³. Facilitarea accesului și informarea cu privire la importanța igienei mâinilor ar putea avea mari beneficii.



1

Intrare

Așezați dezinfecțanții în mod vizibil la toate intrările pentru vizitatori și personal. Utilizați indicatoare și postere pentru a promova igiena mâinilor. Zona de așteptare este un spațiu mare, comun, cu trafic intens, iar riscul de contaminare este prevalent. Vă recomandăm să amplasați dozatoare cu dezinfecțanți fie pe pereți, fie pe suport. Așezați în centru un dozator cu derulare centrală cu prosoape pentru scurgeri.

2

Cantină

Produsele dezinfectante ar trebui plasate lângă intrarea și ieșirea din cantină. Zonele de preparare a alimentelor ar trebui să dispună de un număr suficient de chiuvete dedicate igienei mâinilor. Fiecare stație de spălare trebuie să fie dotată cu dozatoare de săpun și de prosoape de mâini din hârtie. Accesul ușor la produsele de curățare este o modalitate simplă de a vă menține în frunte cu igiena. Recomandăm dozatoare mici sau portabile pentru spațiile aglomerate de la posturile de lucru. Vor fi apreciate dozatoarele de șervețele pe fiecare masă din sala de mese. Asigurați accesul la produse de curățare a suprafețelor pentru a șterge teighelele și pentru a șterge scurgerile din frigider.

3

Toalete publice


În toaletele publice, lângă chiuvete, ar trebui să fie disponibil săpun, dezinfecțanți și prosoape pentru mâini. De asemenea, un produs odorizant ar ajuta la îndepărtarea mirosurilor neplăcute. Folosiți postere cu instrucțiuni privind modul de spălare a mâinilor sau suporturi pentru semne speciale privind dozatoarele. Schimbați afișele în mod regulat pentru o atenție optimă.

³Euro Surveill. 2009 Sep 17;14(37). pii: 19331. Utilizarea suboptimală a dezinfectantului pentru mâini la intrarea într-un spital în timpul unei pandemii de gripă, Noua Zeelandă, August 2009. Murray R1, Chandler C, Clarkson Y, Wilson N, Baker M, Cunningham R; Wellington Respiratory and Hand Hygiene Study Group.

Zone de îngrijire a pacienților

Recomandări pentru spitale privind amplasarea dozatoarelor

Asigurați-vă că dozatoarele sunt amplasate strategic. Iată ce vă recomandăm.



4

Saloane de consultație

Saloanele de consultație au nevoie de acces ușor la dozatoarele cu produse de igienă. Instalați dozatoare cu dezinfectanți la punctul de îngrijire, de preferință închise și montate pe perete, și utilizați dozatoare cu manetă. Asigurați-vă că sunt puse la dispoziție prosoape pentru mâini de hârtie și dozator de săpun lângă chiuvetă, precum și produse de igienizare a suprafețelor pentru a șterge blaturile și suprafețele de examinare după utilizare.

5

Saloane pentru un singur pacient

Plasați dezinfectantele în concordanță cu cele 5 momente pentru igiena mâinilor. Amplasarea dozatoarelor pe „rutele de mers” sau într-o locație unde este oferită îngrijire mai frecvent poate duce la o utilizare mai frecventă. Dozatoarele ar trebui să fie în drum, nu în spatele altui obiect sau în afara razei vizuale. **Notă:** Plasarea dozatoarelor în suportul pentru pat este o completare bună pentru plasarea permanentă a dezinfectanților pe bază de alcool pentru mâini (ABHR).

6

Saloane pentru pacienți multipli


Pentru acest tip de salon este nevoie de mai mult de un dozator. Locațiile familiare elimină necesitatea căutării dozatoarelor. Într-un studiu observațional s-a arătat că dozatoarele amplasate lângă chiuvetă și la intrarea în încăpere au fost utilizate mai frecvent decât dozatoarele aflate în partea din spate a încăperii.⁴ Realizați un studiu al fluxului de lucru pentru a observa care sunt zonele cele mai frecventate dintr-o încăpere, precum și unde stau cadrele medicale atunci când are loc unul dintre cele 5 momente pentru igiena mâinilor. De asemenea, acordați o atenție specială locurilor pe unde se mișcă personalul medical printre pacienți.

⁴Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles, and Ed F Van Beeck, Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit. BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510.

Zone pentru personal

Recomandări pentru spitale privind amplasarea dozatoarelor

Asigurați-vă că dozatoarele sunt amplasate strategic. Iată ce vă recomandăm.



7

Secția asistenților

Posibilitatea de transmitere este mare în această zonă, deoarece spațiul este comun. Dezinfectantul pentru mâini trebuie să fie ușor accesibil pe fiecare parte a secției asistenților și recomandăm să aveți la dispoziție produse de curățare a suprafețelor pentru a șterge spațiile comune. Un studiu observațional a arătat faptul că dozatoarele amplasate în secția asistenților sunt mai frecvent utilizate față de dozatoarele amplasate pe perețele din spatele paturilor pacienților.⁵ De asemenea, plasați dozatoare în locuri „de moment”, cum ar fi coridoarele.

8

Facilități pentru personal

Facilitățile pentru personal sunt zone importante, deoarece este posibil ca personalul să fie proaspăt intrat în unitate. Accesul ușor la o chiuvetă cu săpun, dezinfectant, loțiuni și prosoape pentru mâini din hârtie este un mod simplu de a menține igiena.

9

Camere utilitare

Accesul ușor la rezerve pentru personalul responsabil cu curățenia este important. Plasați rezervele astfel încât să permită personalului responsabil cu curățenia să lucreze în mod eficient și să păstreze alte zone de îngrijire a pacienților igienizate.

⁵Studiu intern Essity, Țările de Jos 2015.